

## Werkwijze bolusinjectie in plaats van infuus


Laatste versie: 7 november 2024

### Voor toediening gereed maken van geneesmiddelen:

- Per 1 november is de toediening van amoxicilline 1000 mg, amoxicilline/clavulaanzuur en ceftriaxon veranderd. Deze worden voortaan in bolusvorm gemaakt en niet meer in zakjes.  
*Let op: deze wijziging geldt niet voor de IC!*
- De flucloxacilline continu toediening wordt klaargemaakt in 2 zakjes van 120 ml i.p.v. 1 zakje van 240 ml.

### Voorschrijvers:


- Schrijf voor via VMO, kies de VMO voor bolus (bolus in naamgeving VMO).



### Apothekersassistenten:

#### Ceftriaxon:

- Op de **afdeling**: kies voor toedieningsvorm IVB:



TESTAFDRUK BEREIDINGSPROTOCOL

Testafdruk bereidingsprotocol    Bereidingslocatie: Satelliet TEST

Werkzame stof: CEFTRIAXON

Toediening: IVB

Afleverform: SPUIT

Volume:    ml    Vloeistof: Water voor Inj


Dosering: 0.00 mg

Maximaal: 0.00 mg

Opslaan    Terug

14-12-2017 12:31:32 6.1.0.a.

- In serie: kies voor toedieningsvorm IVB VRD:



TESTAFDRUK BEREIDINGSPROTOCOL

Testafdruk bereidingsprotocol    Bereidingslocatie: Satelliet TEST

Werkzame stof: CEFTRIAXON

Toediening: IVB VRD

Afleverform: SPUIT

Volume:    ml    Vloeistof: Water voor Inj

Dosering: 0.00 mg

Maximaal: 2000.00 mg

Opslaan    Terug

14-12-2017 12:31:32 6.1.0.a.

*Let op: oplosvloeistof is gewijzigd naar water voor injectie!*

Amoxicilline/clavulaanzuur en amoxicilline wordt niet gemaakt door apothekersassistent wegens korte houdbaarheid.

### Flucloxacilline:

- Kies in CMS voor toedieningsvorm: IV120.
- Verdeel de dagdosering in 2

<b>Testafdruk bereidingsprotocol</b>		<b>Bereidingslocatie:</b> VTGM centraal apotheek
<b>Werkzame stof:</b>	FLUCLOXACILLINE	
<b>Toediening:</b>	IV120	
<b>Aflevervorm:</b>	ZAK	
<b>Volume:</b>	0 ml	<b>Vloeistof:</b>
<b>Dosering:</b>	3000 . 00 mg	
<b>Maximaal:</b>	0.00 mg	
<input type="button" value="Opslaan"/> <input type="button" value="Terug"/>		
<small>14-12-2017 12:31:32 6.1.0.a.</small>		

*Bovenstaand voorbeeld is dus voor een bereiding van 6 gram (2x 3 gram in 120 ml)). Krijgt de patiënt 12 gram? Dan vul je bij dosering 6000 mg in en maak je hier 2 zakjes van.*

### Verpleegkundigen:

- Kijk in het handboek parenteralia hoe de bolus klaar gemaakt dient te worden.
- Dien de bolus toe in 3-5 minuten.